



ÇİFTLİĞİN ŞERİFİ



BUZAĞILARIN BESLENMESİ 2



Buzağların Beslenmesi

- Buzağı, sığır yetiştiriciliğinin temelidir.
- İyi bir bakım ve beslenme programı, buzağların ileriki dönemlerdeki verimliliklerini etkiler.
- Buzağı bakım ve beslemesinde ulaşılmaması gereken 3 hedef vardır.
 1. Buzağının hayatta kalmasını sağlamak
 2. İşkembe gelişimini sağlamak
 3. Süt emme döneminde yüksek canlı ağırlık artışı sağlamak



- Sađlıklı ve iyi geliřmiř buzađıllar yetiřtirmek iin sadece kaliteli bir yem kullanmak ve iyi bir besleme programı uygulamak asla yeterli deđildir.
- Bakım řartları, konfor, temizlik ve hastalıklardan korunma tedbirleri nemsenmediđi takdirde buzađıllarınız zayıf kalabilir, hastalanabilir ve hatta lebilir.





- Doğum sonrasında;
 1. Buzağının solunumu kontrol edilmeli
 2. Burun ve ağızdaki salgılar temizlenmeli
 3. Solunum yoksa uyarılmalı (parmak veya kaşık)
 4. Göbek kordonu (bağı) kopan yerden dezenfekte edilmeli
 5. Hemen ağız sütü (kolostrum) içirilmeli

- Ağız sütü (kolostrum)
 - ✓ Buzağının ilk ve en önemli gıdasıdır.
 - ✓ Gerçek ağız sütü sadece ilk sağımda elde edilir.
 - ✓ Buzağları hastalıklardan koruyan bağışıklık maddelerini içerir.
 - ✓ Doğumu takiben hiç vakit kaybetmeden içirilmelidir.
 - ✓ İlk seferde 2.5–3 lt içirilmelidir.
 - ✓ Buzağı doğduktan sonra 24 saat içinde toplam 5–7 lt ağız sütü içmelidir.



- ✓ Ağız sütü gebelik süresince buzağının barsaklarında biriken atıkların (mekonyum) çıkartılmasını sağlar.



- ✓ Yoğun ve krema kıvamında ağız sütü daha fazla bağışıklık maddesi ve daha fazla besin içerir.
- ✓ Kuru dönemin kısa olması (45 günden az), doğum öncesi meme başından sızma, buzağılama öncesi sağım yapma ve güç doğum ağız sütü kalitesini düşürür.
- ✓ İnekler yaşlandıkça (buzağılama sayısı arttıkça) üretilen ağız sütü kalitesi artar.
- ✓ Düvelerden doğan buzağılara ineklerden alınan kolostrumla takviye yapılması hastalıklardan korunma bakımından yararlı olur.
- ✓ Ağız sütünün fazlası dondurularak saklanabilir.
- ✓ Dondurulan ağız sütü ılık su içerisinde yavaşça çözündürülür ve 38.5–39 C°'de içirilir.



- **Buzağının ilk 3 ayı**

- ✓ Buzağı ilk 3 aylık dönemde bireysel kulübede bakılmalıdır.
- ✓ Süt yaşamın ilk aylarında buzağının temel gıdasıdır.
- ✓ Süt veya buzağı maması 35–38 C° sıcaklıkta biberonla içirilmelidir.
- ✓ Biberon temizliğine özen gösterilmeli ve biberon emziğinin deliği genişlemiş veya yırtılmışsa derhal değiştirilmelidir.

Süt veya buzağı maması besleme programı		
Haftalar	Miktar	Öğün sayısı
1.	4–4.5 lt	2–3
2.	5–5.5 lt	2–3
3.	6–7 lt	2–3
4.	6–7 lt	2–3
5.	6–7 lt	2–3
6.	6–7 lt	2–3
7.	4–4.5 lt	2–3
8.	2–3 lt	1

- ✓ 5 günlük yaştan itibaren buzağının önüne temiz su, buzağı başlangıç yemi ve kaliteli kuru ot konulmalıdır.
- ✓ Buzağılarda hızlı bir işkembe gelişimi için bir an önce buzağı başlangıç yemiyle beslemeye başlamak gerekmektedir.
- ✓ Buzağı başlangıç yemi tüketimi sayesinde işkembedeki parmak benzeri çıkıntılarının (papilla) hızlı bir şekilde çoğalması ve büyümesi yemden yararlanmanın artmasına ve buzağının iyi bir gelişim göstermesine sebep olmaktadır.



- ✓ 5 günlük yaştan itibaren kaliteli kuru ot vermeye başlanmalıdır ve mümkünse kuru ot buzağı başlangıç yemi ile birlikte karıştırılarak verilmelidir.
- ✓ Buzağının önüne sınırlı miktarda kuru ot konmalıdır. Başlangıçta yaklaşık bir avuç kuru ot verilmelidir. Gün geçtikçe ve buzağının yediği başlangıç yemi miktarı arttırdıkça verilen kuru ot miktarı da yükseltilmelidir.



- ✓ Buzağı 3 gün üst üste 700–750 gr buzağı başlangıç yemi tükettiğinde süttten kesilebilir.

- **Buzařılarda 3–6 aylık yař aralıęı**



- ✓ Bu dnemde buzaęılara buzaęı bytme yemi verilmelidir.
- ✓ Buzaęılar 3–6 aylık yař aralıęında cinsiyet ayırımı yapılmaksızın birlikte bakılmalıdır.
- ✓ Erkek ve diři buzaęılar 6 aylık yařta ayrılmalıdır.
- ✓ Buzaęıların yařadığı ortamda temiz ve kuru bir altlıęın bulunması konfor ve saęlık aısından ok nemlidir.
- ✓ 4 aylık yařa kadar buzaęılara silaj ve pancar posası gibi yemlerin verilmesi nerilmez.